


28. *Aphyllanthes* L.*

[*Aphyllánthes*, -is f. – lat. bot. *Aphyllanthes*, -is f., género de las *Liliaceae* establecido por Tournefort (1700) y validado en Linneo (1753, 1754). Evidentemente, su nombre se relaciona con gr. *aphyllánthēs*, -es = planta sin pétalos u órganos laminares –en Teofrasto el *ánthemon aphyllanthēs* es, al parecer, una manzanilla sin lígulas: bien la *Anthémis rigida* Boiss. ex Heldr. (*Compositae*); o quizá la *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert (*Matricaria recutita* L. *Compositae*; llamada incorrectamente *M. Chamomilla* L.); nuestro nombre genérico deriva de gr. *a* = prefijo privativo; gr. *phýllon*, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja; y gr. *ánthē*, -ēs f., *ánthos*, -eos(-ous) n. = flor, etc. Según C. Bauhin (1596, 1623), el vocablo aparece por vez primera, sustantivado y como nombre de planta, en L. Anguillara (1561), “*Aphyllanthes ciò è Frondiflora*” –donde seguramente se hablaría de la *Globularia nudicaulis* L., *Globulariaceae*–; más tarde, P. Pena & M. de L'Obel (1571) llamaron *Aphyllanthos Monspelliensis* al junquillo (*A. monspeliensis* L.), por el nombre, *Aphyllanthos*, que le habían dado los botánicos de Montpellier, mencionando absurdamente unas hojas “pequeñas y junciformes”, efimeras. –Según el ICN, art. 62.4, el género gramatical de *Aphyllanthes* ha de ser el femenino]

Hierbas perennes, cespitosas, cortamente rizomatosas, glabras. Rizoma ± horizontal. Tallo escapo, junciforme, simple, de sección circular, macizo. Hojas reducidas a vainas basales, alternas, escarioas. Flores solitarias o en grupos compactos de 2 o 3 en el ápice de los tallos, sésiles o subsésiles, rodeadas por varias brácteas y bractéolas escarioas, hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± estrellado o subcampanulado, con 6 tépalos libres, casi iguales, oblanceolados, azulados, azul-violetas o raramente blancos, erectos y aproximados en la parte basal y ± patentes en la parte apical, marcescentes. Androceo con 6 estambres libres entre sí, insertos hacia el tercio basal de los tépalos; filamentos filiformes, enteros, glabros; anteras oblongas u ovales, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, séssil, trilocular; estilo 1, que remata en 6 cortas ramas –aparentemente 4 ramas: 3 subterminales, laterales y divergentes, y 1 columna terminal, central, erecta, con las 3 restantes ± connatas–, filiforme, persistente en parte; estigmas ± discoideos, 3 en las ramas laterales, y 3 muy próximos, que aparentan 1 trífido, sobre

* E. Rico



Lám. 43.—*Aphyllanthes monspeliensis*, a-l) Sepúlveda, Segovia (SALA 136507); m, n) entre San Felices y Sargentos de la Lora, Burgos (MA 531414); o-r) Villaescusa de Roa, Burgos (MA 308264): a) hábito; b) detalle del tallo; c) parte basal del tallo y vainas basales; d) vaina basal; e) flor, vista cenital; f) flor, vista lateral; g) involucro, solo con las bractéolas; h, i) brácteas; j) tépalos y estambre; k) gineceo; l) detalle de la porción apical del estílo y los estigmas; m) cápsula y parte del involucro; n) cápsula; o-q) semillas; r) detalle de la ornamentación de una semilla.

J. L. Llorente, 2011

la columna central. Fruto en cápsula loculicida, subglobosa-trígona, con 1 semilla por lóculo. Semillas ovoides, densa y finamente tuberculadas, negras, mates o brillantes.

Observaciones.—Género monoespecífico, endémico del W de la Región Mediterránea, muy diferente morfológicamente del resto de las *Liliaceae* s.l. Número básico propuesto $x = 16$.

1. A. monspeliensis L., Sp. Pl.: 294 (1753) [monspeliénsis]

Ind. loc.: “Habitat Monspelii prope Castelneuf locis montosis saxosis sterilibus”

Ic.: Lám. 43

Hierba perenne. Rizoma hasta de 7(10) cm y 2-4(10) mm de diámetro, macizo, muy ramificado, con raíces fibrosas, largas y filiformes. Tallos (2,5)10-50(70) cm, de 0,7-1,5(2) mm de diámetro, en general numerosos, densamente fasciculados, junciformes, ± rígidos, canaliculados, lisos, glaucescentes. Vainas basales (1)3-12(15) cm, pardo-amarillentas, pardas o purpúreas, a veces variegadas, en ocasiones brillantes, con 3 nervios salientes en la cara abaxial, ± verdes, a menudo emarginadas y con un mucrón —rudimento del limbo— verde. Flores rodeadas, cada una de ellas, por un involucro de (7)10-15 mm, escarioso, endurecido en la base, pardo o pardo-amarillento, a veces variegado y parcialmente purpúreo, constituido por 1-3 brácteas externas, envainadoras, libres, alternas, ovado-lanceoladas, en general emarginadas y ± largamente mucronadas, y por 5 bractéolas —2 externas que alternan con 3 internas— soldadas —entre 1/4 y 1/5 basal— entre sí en una pieza única abierta lateralmente, ovadas u oblongas, obtusas o raramente emarginadas. Tépalos 15-20(25) × 4-5 mm, obtusos, uninervios, azulados, azul-violetas o raramente blancos, rodeados en la parte inferior por el involucro. Estambres más cortos que los tépalos, desiguales, los internos algo más largos que los externos; filamentos 3,8-7 mm; anteras 1-1,7 mm, azuladas o azul-violeta. Estilo 8-12 mm, algo más corto o a veces subigual a los estambres, glabro, con la base endurecida y persistente en el fruto; estigmas c. 1 mm. Cápsula 3-4 × 3-3,5 mm, apiculada, inclusa en el involucro. Semillas 2-2,2 × 1,8-2 mm. $2n = 32$; $n = 16$.

Pastos secos, en roquedos o suelos pedregosos, en sitios abiertos, claros de matorral o de bosque, preferentemente en substrato básico, por excepción en ácido; 0-1600(1800) m. (II)III-VII(VIII). Occidente de la Región Mediterránea, desde el NW de Portugal hasta Italia y desde el N de Marruecos hasta Libia. Principalmente en la mitad E de la Península, se extiende hacia el W por enclaves de Andalucía occidental y Arribes del Duero. **Esp.**: A Ab Al B Bi Bu Ca Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na (O) P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.**: TM. **N.v.:** chunqueta, chunza, chunzeta, clavel seco, espinillo, juncia, junco, junco florido, junquillejo, junquillo, junquillo azul, junquillo de flor azul, junquillo falso, junquillo fino, unquillejo, unquillo, xunqueta; **cat.**: clavellina, chunquet, jonça, jonça borda, jonsa, junça, junceta, llonsa, pá de cuent.

Observaciones.—Existe una mención de esta planta en Ibiza, procedente de una anotación de campo de C. Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 231 (1900). Nunca ha sido confirmada después, por lo que probablemente fuera un error.